

Behandeling van ijzertekort met Ferinject-infuus

Uw arts heeft u een behandeling met een ferinject-infuus voorgeschreven. Ferinject is een medicijn dat ijzertekorten in het lichaam snel aanvult. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Wat is een Ferinject-infuus?

Een infuus met Ferinject is een manier om ijzertekort te behandelen als tabletten of andere ijzerpreparaten niet werken of niet gebruikt kunnen worden. Het medicijn bevat ijzer. IJzer is een belangrijke bouwstof voor de rode bloedlichaampjes die zorgen voor zuurstofvervoer naar onder andere uw spieren en organen. Ferinject is bruin van kleur. De arts schrijft dit medicijn voor:

- Bij ernstige bloedarmoede door tekort aan ijzer.
- Om ijzertekort te voorkomen bij bepaalde aandoeningen waar snel een ijzertekort kan ontstaan (bijvoorbeeld bij nierdialyse).

Voorbereiding op de behandeling

Voor de behandeling met Ferinject hoeft u geen voorbereidingen te treffen. Wel raden wij u aan dat iemand u begeleidt naar het ziekenhuis en terug.

Als u na de bevalling ijzertekort heeft gekregen, krijgt u de behandeling tijdens de opname.

De behandeling met Ferinject

U meldt uzelf op de afgesproken tijd op de afdeling. Uw arts zal u vertellen op welke afdeling u zich moet melden. Dit kan de dagopname zijn of de verpleegafdeling. U krijgt Ferinject via een infuus in een bloedvat van uw arm. De opname duurt ongeveer 1 uur. Het inlopen van het infuus duurt 15 tot 30 minuten. Daarna moet u nog een half uur blijven ter observatie om te zien of u last van bijwerkingen krijgt. De arts houdt bij de bepaling van de dosering rekening met uw leeftijd, gewicht en hoe erg het ijzertekort is. Het geven van het Ferinject doet geen pijn. De meeste mensen merken binnen 1 tot 2 weken het effect van de behandeling. Zo zult u minder moe zijn.

Mogelijke bijwerkingen

De meeste mensen reageren goed op het Ferinject-infuus. Sommige mensen krijgen de volgende klachten:

- 1 tot 10% van de patiënten heeft last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn en obstipatie. U kunt ook last hebben van huiduitslag op de toedieningsplaats. Daarbij kunt u last hebben van een branderig en/of pijnlijk gevoel, roodheid, zwelling en een blauwe plek.
- Minder dan 1% van de patiënten heeft last van een prikkelend gevoel meestal in handen en voeten (paresthesie), hoge bloeddruk, roodheid, verandering van smaak, braken, dyspepsie (maagklachten), windrigheid, jeuk, netelroos, spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, koude rillingen, koorts, vermoeidheid, pijn in de borstkas, stijfheid, malaise, en perifeer oedeem.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermedischcentrum.nl

- Een ernstige bijwerking die bijna nooit voorkomt, is een allergische reactie. Hierdoor kan ook een ernstige anafylactische reactie ontstaan. Gebeurt dit tijdens de infuusbehandeling? Dan stopt de verpleegkundige het infuus meteen. In overleg met de arts worden de klachten behandeld met medicijnen, onder andere prednison en tavegil.
- Verkleuring van de huid is een bijwerking die zelden voorkomt (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers). Verkleuring van de huid kan ook voorkomen als het medicijn buiten het bloedvat komt.

De bijwerkingen merkt u meestal direct na het toedienen van het Ferinject-infuus. Allergische reacties kunnen ook na enkele uren tot 4 dagen na de behandeling nog ontstaan. Dit merkt u aan pijn in uw spieren en gewrichten en soms krijgt u koorts. Dit verdwijnt meestal na 2-4 dagen. Het wel of niet hebben van bijwerkingen is niet van invloed op de werking van het medicijn. Het Ferinject-infuus bevat een hoge dosering ijzer.

Wanneer moet u contact opnemen met uw arts?

- Als u binnen 48 uur koorts krijgt boven 38,2°.
- Als u binnen 48 uur hevige hoofdpijn krijgt.
- Als u zich algeheel ziek voelt.

U belt dan:

- Maandag - vrijdag tussen 08:30 – 16:30 naar de polikliniek Verloskunde via telefoonnummer: **033-850 4843**.
- Buiten deze tijden het **spoednummer** van de afdeling Meander Moeder Kind 24 uur per dag bereikbaar via het spoednummer **033 – 850 4848**.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk en uiterlijk een werkdag voor de opnamedag naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de opnamen verkouden, hoest u of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.